

נייר עמדה של האיגוד הישראלי לניאונטולוגיה הנחיות לבדיקת "החזר אדום" שגרתיות בילודים

כללי

בדיקות עיניים שגרתיות בילודים בריאים חיוניות לאיתור מומים ומחלות עיניים. זיהוי וטיפול מוקדם במחלות כגון קטרקט ורטינובלסטומה יכולים למנוע עיוורון ואף להציל חיים.

בדיקת החזר אדום היא בדיקה סקר פשוטה שמטרתה לאתר מחלות ומומים בעיניים המסכנים את הראיה או את חיים. מומלץ לבצע את בדיקת החזר האדום בימים הראשונים לחיים, בטרם שחרור הילוד מבית החולים.

בצוע הבדיקה

הבדיקה יכולה להתבצע בחדר מואר או חשוך. אין צורך בהרחבת האישונים של הילוד. על הבודק לכוון מקור אור (עדיף אור האופתלמוסקופ הישיר - direct ophthalmoscope) ישירות אל כל אישון בנפרד ולהתרשם מסדירות החזר האור המתקבל. בזמן הבדיקה יש גם לבחון את תקינות המבנה החיצוני של העפעפיים והעיניים.

מבצע הבדיקה

רופא הבודק את הילודים בקבלה למחלקה או בשחרור. במידה שילוד משוחרר מבית החולים טרם בוצעה בדיקת החזר אדום, יש להפנות את הילוד לבדיקה שתבוצע עד חודש מהלידה.

מצבים בהם דרוש יעוץ של רופא עיניים

- (1) במקרה ומתקבל החזר אור לבן מהעין או קיים חוסר מלא או חלקי של החזר.
- (2) בילדים עם סיפור משפחתי של בעיות עיניים מולדות, כגון קטרקט, רטינובלסטומה או גלאוקומה מולדת.
- (3) במקרים של ניסטגמוס.
- (4) הנחיות אלה אינן מתיחסות לפגים שייבדקו על פי הנוהל לבדיקת פגים הקיים בבית החולים.